

ESPÉCIES DO GÊNERO

Sporophila Cabanis,
1844 no Brasil
(Aves, Emberezidae) - continuação

Frederico Lencioni Neto

14 - *Sporophila bouvreuil* Muller, 1776 Caboclinho (Fig. 14)

Descrição: 10,5 cm. Macho com a fronte e alto da cabeça pretos, o resto da plumagem é canela avermelhada.

Sub-espécie: *Sporophila b. bouvreuil* Muller, 1776 - Macho de coloração canela-avermelhada com o alto da cabeça preto. Asas e cauda pretas.

Sporophila b. pileata Sclater, 1864 - Macho com as partes superiores pardo-acinzentado-claras com o alto da cabeça preto. Partes inferiores esbranquiçadas (às vezes rosadas ou amarelada).

Sporophila b. crypta, Sich () - macho pardo sem boné preto. As fêmeas são pardas.


Habitat: Encontrado nos pântanos com arbustos e gramíneas.

Voz: Canto varrido, longo e rápido lembrando *Spinus*.

Distribuição: *s. b. bouvreuil*: Brasil: Maranhão, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

s. b. pileata: Argentina, Paraguai e Brasil: Sul de Minas Gerais, São Paulo, Paraná.

s. b. crypta: Rio de Janeiro.



15 - *Sporophila minuta* Linnaeus, 1758 Caboclinho-do-norte (Fig. 15 A)

Descrição: 10 cm. Macho: Partes superiores de coloração pardo-olivácea, uropígeo castanho. Rêmiges terciárias e coberturas bordadas de marrom claro; rêmiges primárias marcadas de branco na base. Partes inferiores ferrugíneas. Bico negro, trase e dedos marrom-escuro. Fêmeas com coberturas das asas marrom-escuro com as bordas cor de palha. Barras das asas pouco marcadas.


Habitat: Áreas abertas (campos de cultura, pastos, jardins) principalmente com gramíneas com sementes.

Voz: melodiosa.

Distribuição: Guianas, Venezuela, baixo Rio Amazonas. Tapajós e Tocantins, Pará e Amapá.

Sub-espécie: *Sporophila minuta hypoxantha* Cabanis, 1851 (Fig. 15 B) - Macho com as partes superiores cinza-azuladas-claras, partes inferiores e lados da cabeça ferrugíneo-acanelados. Fêmeas pardas.

Distribuição: Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.




16 - *Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851
Caboclinho-paraguaio (Fig. 16)

Descrição: 10 cm. Macho com a parte superior cinza e uropígeo ferrugíneo. Peito e abdômem ferrugíneos. Rêmiges primárias com branco na base. Bico preto, íris marrom. Tarso e dedos castanhos. Fêmeas esverdeadas na parte superior e bege-claro na inferior.

Habitat: Campos.

Voz: Lembra o canto de *S. minuta*.

Distribuição: Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil: Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.




18 - *Sporophila castaneiventris* Cabanis, 1849

Papa-capim-de-peito-preto (Fig. 18)

Descrição: 10 cm. Macho com as partes superiores e lados do corpo cinza-azulado. O meio das partes inferiores, da garganta até as coberteiras inferiores da cauda castanhas. Asas e cauda negras. Rêmiges primárias marcadas de branco na base. Terciários e coberteiras com as bordas cinzas. Fêmeas com as partes superiores oliváceas e inferiores ocráceas.

Habitat: Campos com gramíneas e margens dos rios.

Distribuição: Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Perú, Brasil: Acre, Rondônia, Pará e Minas Gerais.



17 - *Sporophila palustris* Barrows, 1883
Pega-capim-cinza-branco-vermelho
(Fig. 17)



Descrição: 9,6 cm. Macho com as partes superiores cinza, uropígeo castanho. Lados da cabeça, garganta e peito brancos. Rêmiges primárias com mancha branca na base. Barriga castanha. Bico pardo-amarelado, tarso e pés acinzentados. Fêmea cinza-esverdeado na parte superior.

Habitat: Áreas de banhado com gramíneas altas, margens de riachos.

Voz: Canto ascendente e descendente lembrando *S. bouvrevil*.

Distribuição: Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.






19 - *Sporophila cinnamomea* Lafresnaye, 1839

Caboclinho-de-chapéu-cinzeno (Fig. 19)

Descrição: 10 cm. Macho castanho-escuro com o alto da cabeça e fronte-cinzentas. Asas escuras com as rêmiges primárias marcadas de branco na base, cauda preta. Bico amarelo-claro. Fêmea semelhante, porém mais clara.

Habitat: Áreas com gramíneas.

Distribuição: Argentina, Paraguai e Brasil: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná e Mato Grosso.



20 - *Sporophila melanogaster* Pelzelin, 1870

Papa-capim-de-peito-negro (Fig. 20)

Descrição: 10 cm. Macho cinzento-claro com a garganta, peito, abdômem e coberturas inferiores da cauda negras. Asas e caudas negras. Rêmiges primárias bordadas de cinza. Bico amarelo ou preto, íris marrom. Fêmea - Parte superior esverdeada, inferior mais clara, lavada de cinza.

Habitat: Áreas campestres e brejos. Típico de áreas serranas.

Distribuição: Paraguai e Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

