


Rubino.jpg (*Roseicollis Rubino*)



Uma das maiores brigas entre os criadores de Agapornis é sem dúvida nenhuma quando “aparecem” na criação aves pintadas de vermelho ou ainda que ficam pintadas de vermelho após a primeira muda e mesmo totalmente vermelhas.

AGAPORNIS VERMELHOS, MUTAÇÃO OU DOENÇA?

Muitos criadores, principalmente iniciantes vêm entusiasmados contar sobre uma nova mutação que surgiu em seus criadores, outros começam a selecioná-las. Muitos colegas mais velhos e experientes descartam estas aves devido a dificuldade em mantê-las, outros afirma que se trata apenas de um indivíduo doente, “com problemas de fígado”.

Por tudo isso, aqui venho reavivar um pouco esta discussão e talvez clarear mais as posições dos vários colegas criadores, tanto os experientes, quanto os mais jovens nesta arte de criação.

Recentemente tenho discutido com outros colegas criadores em publicações diversas em diferentes países sobre a existência de uma mutação vermelha de Agapornis. A

maioria dos escritos coloca a teoria que eventuais periquitos vermelhos seriam provenientes de um defeito, ou doença do fígado. Outros colocam como um fator nutricional, ou seja, dependente da comida oferecida as aves.

Confesso que recentemente voltei a acender as chamas da polêmica com a publicação de meu livro nos Estados Unidos e Europa e, ao mesmo tempo esclarecendo as dúvidas restantes.

Mas o que são agapornis vermelhos? Precisamos deixar claro que existem dois tipos de vermelhos: aqueles provenientes da chamada “SUFUSÃO VERMELHA” e os “RUBINOS”.

Aves com sufusão vermelha podem ser encontrados em todo o mundo nas mais variadas cores de fundo (lutinos,

